

INDICATIONS: For topical use on animals as an aid in preventing infection and reducing pain. Kills up to 99% of surface germs in 15 seconds or less that can potentially cause an infection.

ACTIVE INGREDIENTS

Povidone-Iodine (2% available iodine)
Lidocaine 2% w/v
Ethyl Alcohol – less than 80%
Isopropyl Alcohol – less than 5%

PURPOSE

Antiseptic
Pain Relief
Antiseptic
Antiseptic

DIRECTIONS: Pour into a spray bottle dialed to spray pattern, hold sprayer about 4–6 inches from area to be treated. Spray 1 or more times — allow to dry. Repeat as needed. Forms a highly visible coating that is durable.

WARNINGS: Do not use in the eyes. Do not use if allergic or sensitive to the active ingredients. Prolonged exposure may cause irritation. If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away. Avoid inhalation.

Store upright at 15°–25° C (59°–77° F). Brief excursions up to 40° C (104° F) are permitted.

**FLAMMABLE — USE WITH CAUTION
FOR EXTERNAL USE ONLY
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
WET HAIR OR FUR IS FLAMMABLE
DOT Name: Ethanol Solutions UN1170,3,PGII**



TAKE TIME



OBSERVE LABEL
DIRECTIONS

REORDER NO: 19009

MANUFACTURED BY:
Aurora Pharmaceutical, Inc.
NORTHFIELD, MINNESOTA 55057
1-888-215-1256
www.aurorapharmaceutical.com
IN 50-1186 06/2023

NDC 51072-041-01

BARRIER® II

Wound Care Spray With Pain Relief

2% Available Iodine With Lidocaine Does Not Contain Bitrex

(Patent pending)

For Veterinary Use Only

1 Gallon (3.79 liters)



INDICACIONES: Para uso tópico en animales para ayudar a prevenir la infección y a reducir dolor. Mata hasta el 99% de los gérmenes superficiales en 15 segundos o menos, que potencialmente pueden causar una infección.

INGREDIENTES ACTIVOS

Yodopovidona (Yodo al 2%)
Lidocaína 2% p/v
Alcohol etílico – menos del 80%
Alcohol isopropílico –
menos del 5%

PROPÓSITO

Antiséptico
Anestésico local
Antiséptico
Antiséptico

INSTRUCCIONES DE USO: Verter en botella de spray, configurada para rociar, mantener rociador a unas 4–6 pulgadas de la zona a tratar. Rocíar una o más veces, dejar a secar. Repetir según sea necesario. Forma una capa que es altamente visible y duradera.

ADVERTENCIAS: No utilice en los ojos. No utilice en caso de alergia o sensibilidad a los ingredientes activos. La exposición prolongada puede causar irritación. En caso de ingestión, busque ayuda médica o contacte al Centro de Control de Envenenamiento (Poison Control Center) inmediatamente. Evite la inhalación.

Almacenar verticalmente a 15°–25° C (59°–77° F). Excursiones breves hasta 40° C (104° F) son admisibles.

**INFLAMABLE – USAR CON CUIDADO
SÓLO PARA USO EXTERNO
MANTENER FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS
PELO O PELAJE MOJADO ES INFLAMABLE
Nombre de DOT: Ethanol Solutions
UN1170,3,PGII**

MANUFACTURED IN THE USA

